

マガモ

(*Anas platyrhynchos*) カモ^{もく}目カモ^か科



【生息地】^{せいそくち}河川^{かせん}や湖^{みずうみ}、港^{みなと}など

【大きさ】^{おお}成鳥^{せいちょう}は55～60cm

【食性】^{しょくせい}主に^{おも}水草^{みずくさ}の葉^はや茎^{くき}、植物^{しゅくぶつ}の種子^{しゅし}、貝^{かい}などを^た食べるよ。


【特徴】^{とくちょう}水面^{すいめん}で群れ^むをつくって生活^{せいかつ}しているよ。

^{あたま}頭^{みず}を水^つに突っ込^こんで、時^{とき}には逆^{さか}さになってエサ^{さが}を探^{さが}しているよ。

くちばしは^{めだ}目立つ^{きいろ}黄色^{きいろ}で、オスは^{あたま}頭^{みどりいろ}が緑色^{みどりいろ}、メスは^{ちやいろ}茶色^{ちやいろ}をしているよ。

ツバメ

(*Hirund rustica*) スズメ^{もく}目ツバメ^か科



【^{せいそくち}生息地】^{ほっかいどう}北海道から^{きゅうしゅう}九州（^{はる}春～^{なつ}夏）

【^{おお}大きさ】^{ぜんちょう}全長は約^{やく}17cm

【^{しょくせい}食性】^{おも}主に^と飛んでいる^{こんちゅうるい}昆虫類を^た食べるよ。

【^{とくちょう}特徴】^{こうそくひこう}高速飛行や^{きゅうせんかい}急旋回が得意で、いつも^た田んぼの^{しゅうへん}周辺を
^と飛んでいるよ。

^{はる}春に^{とうなん}東南アジアから^き来て、^{あき}秋の^{はじ}初めに^{かえ}帰る「^{なつどり}夏鳥」
だよ。

【^{ざつがく}雑学】^{あめ}雨が^ふ降る^{まえ}前はエサを^と捕るために^{ひく}低く^と飛ぶから、
「^{ひく}ツバメが^と低く^{あめ}飛ぶと^い雨」と言われているよ。

ハクセキレイ

(*Motacilla alba*) スズメ^{もく}目セキレイ^か科



【^{せいそくち}生息地】^{みずべ}水辺^{ふきん}付近、^{のうち}農地、^{どうろ}道路

【^{おお}大きさ】^{ぜんちょう}全長は20cm

【^{しょくせい}食性】^{すいせいこんちゅう}水生昆虫や^{ちい}小さな^{むし}虫を^た食べているよ。

【^{とくちょう}特徴】^{おばね}尾羽を^{じょうげ}上下に^ふ振りながら、^{すばや}素早く^{ある}歩くことができるよ。

【^{ざつがく}雑学】^{せなか}背中が^{しろ}白くて^{きれい}綺麗だからこの^{なまえ}名前が^つ付けられたよ。

「^なチチン、チチン」と^{なみじょう}鳴きながら^と波状に飛ぶよ。

アオサギ

(*Ardea cinerea*) コウノトリ目サギ科



【生息地】^{せいそくち} 河岸、^{かわぎし} 湖畔、^{こはん} 湿地、^{しっち} 水田などの^{すいでん} 水辺^{みずべ}

【大きさ】^{おお} 全長は約 9 0 c m、^{ぜんちょう} 翼開長は約 1 6 0 c m^{よくかいちょう}

【食 性】^{しょくせい} 肉食性で^{にくしょくせい} 魚や^{さかな} 両生類、^{りょうせいいるい} 爬虫類、^{はちゅうるい} 甲殻類などを^{こうかくるい} 食べて^た いるよ。

【特 徴】^{とくちょう} 日本では^{にほん} 最も^{もっと} 大きい^{おお} サギだよ。

^め 目の上に^{うえ} 目立つ^{めだ} 黒い^{くろ} 模様^{もよう}があるよ。

【雑 学】^{ざつがく} 昔は^{むかし} 白でも^{しろ} 黒でもない^{くろ} 灰色^{はいいろ}を^{あおいろ} 青色^いと言っていたこと^よ から「アオサギ」と呼ばれているよ。

カワウ

(*Phalacrocorax carbo*) カツオドリ目ウ科



【生息地】^{せいそくち} 河川^{かせん}や湖^{みずうみ}、港^{みなと}など

【大きさ】^{おお} 全長は約80cm、^{ぜんちょう} 翼開長^{やく}は約130cm

【食性】^{しょくせい} 肉食性^{にくしょくせい}で水^{みず}の中に潜^{なか}って魚^{もぐ}を食^{さかな}べているよ。

【特徴】^{とくちょう} 9m^{ふか}くらいの深さ^{みず}まで水^{なか}の中に潜^{もぐ}ることができるよ。

^{ながらがわ} 長良川^{うか}の鵜飼^{さかな}いで魚^つを捕ま^{なかも}えているのは仲間のウミウだよ。

【雑学】^{ざつがく} ウミウとはくちばし^つの付け根^ねの黄色^{きいろ}の形^{かたち}で見分^{みわ}けることができるよ。

ヒドリガモ

(*Anas penelope*) ^{もく}カモ目^かカモ科



【^{せいそくち}生息地】^{かせん}河川^{こしょう}や湖沼^{としいき}、都市域^{いけ}の池^{えんがんぶ}、沿岸部

【^{おお}大きさ】^{ぜんちょう}全長は約50cm、^{よくかいちょう}翼開長は約70cm

【^{しょくせい}食性】^{たね}種もみ^{ふようしょくぶつ}や浮葉植物^{ちんすいしょくぶつ}、沈水植物^{しょくぶつ}、植物^みの実を
^た食べているよ。

【^{とくちょう}特徴】^{ちゃかつしょく}茶褐色^{あたま}の頭^{とくちょう}が特徴で、オスは^{ひたい}額から^{とうちょうぶ}頭頂部にかけて
^{いろ}クリーム色だよ。

オスは^{くちぶえ}口笛^ふを吹いたような「ピューピュー」、
メスは^{ひく}低い^{こえ}声で「ガーガー」と^な鳴くよ。

^{ちゅうがた}中型^{おな}のカモで、カラスと同じくらい^{おお}の大きさだよ。

カイツブリ

(*Tachybaptus ruficollis*) カイツブリ目カイツブリ科



【生息地】^{せいそくち}湖沼^{こしょう}や池^{いけ}、内湾^{ないわん}

【大きさ】^{おお}全長は約25cm、^{ぜんちょう}翼開長^{よくかいちょう}は約45cm

【食性】^{しょくせい}雑食性で小魚^{ざっしょくせい}、水生昆虫^{こざかな}や植物の実^{すいせいこんちゅう}などを食べているよ。

【特徴】^{とくちょう}水に潜^{みず}るのが得意^{もぐ}だけど、足^{あし}の位置^{いち}が体^{からだ}の後ろ^{うし}にある^{ある}から、歩^{にがて}くのが苦手だよ。

【雑学】^{ざつがく}赤ちゃん^{あか}を背中^{せなか}に乗せて子育て^のをするよ。

^{なつ}夏^{かわ}に川から「キュルルルル」という鳴き声^なが聞こえたら、近く^{ちか}にいるよ。

オオバン

(*Fulica atra*) ツル目クイナ科



【生息地】^{せいそくち}湖や沼、^{みずうみ}河川^{ぬま}

【大きさ】^{おお}全長は約40cm、^{ぜんちょう}翼開長は約70cm^{よくかいちょう}

【食性】^{しょくせい}雑食性でコケや水草、^{ざっしょくせい}水生生物を^{みずくさ}食べているよ。^{すいせいせいぶつ}

【特徴】^{とくちょう}全身真っ黒^{ぜんしん}だけど、くちばしと額が^{くろ}白いから目立つよ。^{ひたい}

^{えさ}餌をとるために頭を^{あたま}水中に入れて、^{すいちゅう}10秒以上^い潜って

いることもあるよ。

^{およ}泳ぎは^{にがて}苦手だけど、水草の^{みずくさ}茂みを^{しげ}歩くのは^{ある}得意だよ。^{とくい}

キンクロハジロ

(*Aythya fuligula*) ^{もく}カモ^か目カモ科



^{せいそくち}【生息地】^{かせん}河川^{みずうみ}や湖^{みなと}、港など

^{おお}【大きさ】^{ぜんちょう}全長は約45cm、^{よくかいちょう}翼開長は約70cm

^{しょくせい}【食性】^{おも}主に貝^{かい}やエビ^{むし}、虫^{みずくさ}、水草などを^た食べているよ。

^{とくちょう}【特徴】^たエサを食べるために、^{すいちゅう}水中を10mも^{もぐ}潜ることができるよ。

^{あたま}頭の羽は、^{はね}光^{ひかり}の^あ当たり方によって^{かた}紫色^{むらさきいろ}に見えることが
^みあるよ。

^{ざつがく}【雑学】^{きんいろ}金色の目^め、^{くろいろ}黒色の体^{からだ}、^{しろいろ}白色の羽^{はね}をしていることから
「キンクロハジロ」という^{なまえ}名前がつけられたよ。

ハシビロガモ

(*Anas clypeata*) ^{もく}カモ^か目カモ科



^{せいそくち}【生息地】^{かわ}川^{みずうみ}や湖^{ぬま}、^{いけ}沼、池など

^{おお}【大きさ】^{ぜんちょう}全長は約50cm、^{よくかいちょう}翼開長は約75cm

^{しょくせい}【食性】^{しゅし}種子やプランクトン、^{こんちゅう}昆虫などを^た食べているよ。

^{とくちょう}【特徴】^めオスの目は^{きいろ}黄色で、メスは^{ちゃいろ}こげ茶色をしているよ。

^{なが}長い^{がた}ヘラ型の^{なかま}くちばしをしたカモの仲間だよ。

^{ざつがく}【雑学】^{ふゆどり}冬鳥なので^{はる}春や^{なつ}夏にはいないけど、^{ほっかいどう}まれに北海道で^{はんしょく}繁殖することもあるよ。

カワセミ

(*Alcedo atthis*) ブッポウソウ目カワセミ科



【生息地】^{せいそくち} 植物が豊かな^{しょくぶつ} 河川や^{ゆた} 池などの^{かせん} 水辺^{いけ}

【大きさ】^{おお} 全長は約 17 cm、^{ぜんちょう} 翼開長は約 25 cm^{よくかいちょう}

【食性】^{しょくせい} 魚類や^{ぎょるい} 水生昆虫などを^{すいせいこんちゅう} 食べているよ。^た

【特徴】^{とくちょう} 背中が^{せなか} 鮮やかな^{あざ} 青色^{あおいろ} をしていることから、
「^{そら} 空^と 飛ぶ^{ほうせき} 宝石^よ」と呼ばれているよ。

^{つち} 土の^{しゃめん} 斜面に^{あな} 穴を^ほ 掘って^{すあな} 巣穴をつくるよ。

^{からだ} 体に対して^{たい} くちばしが^{なが} 長く、^{さかな} 魚の^と 採りやすい^{たいけい} 体型を
しているよ。

【雑学】^{ざつがく} 「チーッ」と^な 鳴きながら^{すいめんちか} 水面近くを^{こうそく} 高速で^ま 真っすぐ
に^と 飛ぶよ。

オオタカ

(*Accipiter gentilis*) タカ目タカ科



【生息地】^{せいそくち} 森林、^{しんりん} 河川、^{かせん} 農耕地、^{のうこうち} 住宅街^{じゅうたくち}

【大きさ】^{おお} 全長は約 5 0 c m、^{ぜんちょう} 翼開長は約 1 1 5 c m^{よくかいちょう}

【食性】^{しょくせい} 主にハトやカモの^{おも} 小さい^{ちい} 鳥を^{とり} 好んで^こ 食べているよ。^た

【特徴】^{とくちょう} 背面は^{はいめん} 青黒色で^{あおぐろいろ} 腹面には^{ふくめん} 白くて^{しろ} 細い^{ほそ} 波状の^{はじょう} 斑点があるよ。^{はんでん}

【雑学】^{ざつがく} 視力は人間の約 5 倍で、^{しりよく} 一度^{にんげん} 狙いをつけた^{やく} 獲物は^{ばい} 捕ま^{いちど} えるまで^{ねら} 追い続けるよ。^{えもの} ^{つか}

^{かんきょうしょう} 環境省のレッドリスト絶滅危惧種第Ⅱ類から、
^{じゅんぜつめつきぐしゅ} 準絶滅危惧種^{へんこう}に変更されたよ。

バン

(*Gallinula chloropus*) ツル目クイナ科



【生息地】^{せいそくち} 湿地、^{しっち すいでん} 水田

【大きさ】^{おお} 全長は約 3 5 c m、^{ぜんちょう やく} 翼開長は約 5 0 c m

【食性】^{しょくせい} 雑食性で昆虫や甲殻類、^{ざっしょくせい} 植物の種^{こんちゅう こうかくるい}などを食べているよ。^{しょくぶつ たね た}

【特徴】^{とくちょう} 河川や池で生活しているけど、^{かせん いけ せいかつ} 泳ぎは苦手だよ。^{およ にがて}

^{からだ くら} 体は黒っぽく、^{つばさ みどりいろみ} 翼は緑色味のある黒褐色^{くろかつしよく}をしているよ。

【雑学】^{ざつがく} 鳴き声^{なき ごえ}が大きくてよく聞こえることから、^{おお き}
「^{た ばん}田の番^{とり}をする鳥」の意味からバンと名付けられたよ。^{いみ なづ}

トビ

(*Milvus migrans*) ^{もく}タカ目^かタカ科



【^{せいそくち}生息地】^{ていざんち}低山地、^{しがいち}市街地、^{のうこうち}農耕地、^{かせん}河川、^{ぎょこう}漁港、^{かいがん}海岸

【^{おお}大きさ】^{ぜんちょう}全長は約 6 0 c m、^{よくかいちょう}翼開長は約 1 6 0 c m

【^{しょくせい}食性】^{ふだん}普段は^{どうぶつ}動物の^{しがい}死骸や^{にんげん}人間の^だ出した^{ざんぱん}残飯を^た食べているよ。

【^{とくちょう}特徴】^{えもの}獲物を見つけると^み^{じょうくう}上空から^{きゅうこうか}急降下して^{つか}捕まえるよ。

【^{ざつがく}雑学】「^なピーヒョロロ」と鳴くよ。

タカの^{なかま}仲間で「とんび」とも^よ呼ばれているよ。

ダイサギ

(*Egretta alba*) ペリカン目サギ科



【生息地】^{せいそくち}河川、^{かせん}水田、^{すいでん}干潟などの^{ひがた}水辺^{みずべ}

【大きさ】^{おお}全長は約90cm、^{ぜんちょう}翼開長は約130cm^{よくかいちょう}

【食性】^{しょくせい}肉食で河川や水田にいる^{にくしょく}小魚などを^{かせん}食べているよ。^{すいでん} ^{こざかな} ^た

【特徴】^{とくちょう}空を飛ぶ時や^{そら}静止している時は^と首をS字状に^{とき}曲げて^{せいし} ^{とき} ^{くび} ^{じじょう} ^ま ^{いるよ。}

^{ぜんしんしろいろ}全身白色で、^{はんしょくき}くちばしは繁殖期になると^{くろいろ}黒色で、
^{ひはんしょくき}非繁殖期は^{きいろ}黄色をしているよ。

【雑学】^{ざつがく}縄張り争いをする時に「ガアアア」や「グア」と^{なわば} ^{あらそ} ^{とき} ^{おおごえ} ^だ ^{あいて} ^{いかく} ^{大声を出して} ^{相手を威嚇するよ。}

コサギ

(*Egretta garzetta*) コウノトリ目サギ科



【生息地】^{せいそくち}水田^{すいでん}や川^{かわ}辺^べ、海岸^{かいがん}、池^{いけ}、湖沼^{こしょう}

【大きさ】^{おお}全長^{ぜんちょう}は約^{やく}60cm、翼開長^{よくかいちょう}は約^{やく}100cm

【食性】^{しょくせい}肉食性^{にくしょくせい}で小魚^{こぎょ}やザリガニ^{ざりがに}を^た食べているよ。

【特徴】^{とくちょう}ツルと違^{ちが}って、首^{くび}をS字型^{じがた}に縮^{ちぢ}めて空^{そら}を飛^とぶよ。

^{なつ}夏の繁殖期^{はんしょくき}になると、オスとメス共^{とも}に2～3本の^{ほん}冠羽^{かんう}が頭^{あたま}につくよ。

【雑学】^{ざつがく}「グー、グー」や「ゴアーゴアー」と鼻^{はな}にかかったような、しわがれた太^{ふと}い声^{こえ}で鳴^なくよ。